

Hoja informativa sobre la sífilis

La sífilis, causada por la bacteria *Treponema pallidum*, normalmente es indistinguible de otras enfermedades, lo que lleva a la aparición de complicaciones tardías cuando no se la trata.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Con frecuencia son indistinguibles de otras enfermedades y pueden desaparecer sin tratamiento.
- Los individuos pueden no tener síntomas.
- Si los mismos aparecen, normalmente lo hacen 1 a 3 semanas después de la exposición.

Los síntomas incluyen:

- Llagas(s) (chancro) en los genitales externos (vagina, pene), en el ano o el recto o en los labios o la boca (normalmente las llagas son pequeñas, firmes, redondas e indoloras). Pueden durar de 2 a 5 semanas.
- Sarpullido en la piel (puntos ásperos, rojos o marrón rojizo en las palmas de las manos o las plantas de los pies). También pueden aparecer en el torso. Puede aparecer en forma de puntos ásperos, rojos o marrón rojizo. Usualmente el sarpullido no pica.
- Fiebre
- Ganglios linfáticos hinchados
- Dolor de garganta
- Pérdida del cabello despereja
- Dolores de cabeza
- Pérdida de peso
- Dolores musculares
- Fatiga

TRANSMISIÓN

- Sexo vaginal, anal u oral
- Madre infectada al neonato

COMPLICACIONES/CONSECUENCIAS

Si no se trata la sífilis, puede provocar:

- Daño al cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las articulaciones.
- Parálisis, entumecimiento, ceguera gradual y demencia
- Muerte
- Dificultad para la coordinación motora
- Aumento del riesgo de contraer la infección por VIH

Si no se la trata durante el embarazo, la sífilis puede provocar:

- Aumento del riesgo de dar a luz un niño muerto
- Si no se trata al bebé, puede sufrir un retraso en su desarrollo, tener convulsiones o morir.

TRATAMIENTO

El tratamiento debería incluir una medicación prescrita por un proveedor de servicios de salud (normalmente se usa penicilina).

PREVENCIÓN

- Absténgase de tener contacto sexual
- Mantenga una relación en que ambas partes sean monógamas, con una pareja que se haya hecho el examen de detección y no esté infectada.
- Utilice siempre y correctamente condones que sean de látex durante el sexo vaginal, anal y oral con penetración del pene.
- Use correctamente una barrera de látex para el sexo oral en la vagina o el ano.
- Evite todo contacto sexual hasta haber completado el tratamiento.
- Tratamiento adecuado de la pareja.

Recomendaciones para evitar la propagación de la infección:

- Discontinuar el contacto sexual si aparecen signos o síntomas
- Prueba de detección durante el embarazo
- En caso de estar infectada(o), notifique a todas sus parejas recientes
- Concurra inmediatamente al médico si tiene sarpullido o una llaga.

Información de contacto:

Para obtener más información acerca de los lugares y servicios médicos de Florida, y de las recomendaciones para el tratamiento, visite nuestro sitio web en http://www.doh.state.fl.us/disease_ctrl/std/clinical/clinical.html o escríbanos por correo electrónico a: HSD_STD@doh.state.fl.us

Línea directa nacional sobre las ETS

1-800-227-8922 (24 hs., 7 días a la semana)

Español

1-800-344-7432 (8am-2pm EST, 7 días a la sem.)

Personas con discapacidad auditiva

1-800-243-7889 (10am-10pm EST, lun. a vie.)